



RAFA M. MARIN

Antonio Alcaraz, del Hospital Clínico de Barcelona.

## **El cribado evita un 20% de las muertes por cáncer de próstata**

El cribado con PSA reduce en un 20 por ciento la mortalidad por cáncer de próstata, según los resultados presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Urología.

**PÁG. 12**

---



EN HOMBRES DE 50 A 75 AÑOS CON UN ÍNDICE DE PSA SUPERIOR A 2,5 Y CON BIOPSIA NEGATIVA

## Dutasteride reduce el riesgo de presentar tumores de próstata bien diferenciados en los pacientes con HBP

■ **Karla Islas Pieck** Barcelona

El tratamiento con dutasteride, un doble inhibidor de las dos isoenzimas de la  $5\alpha$ -reductasa, reduce en un 23 por ciento el riesgo relativo de desarrollar cáncer de próstata en los hombres de entre 50 y 75 años con un elevado índice del antígeno prostático específico (PSA), según los resultados del estudio *Reduce*, presentados durante el XXV Congreso de la Sociedad Europea de Urología (EAU), que se celebra estos días en Barcelona.

La investigación es de tipo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo y ha analizado datos de 8.231 pacientes durante cuatro años de seguimiento. Ha demostrado que la terapia con 0,5 mg al día de dutasteride, indicada en los pacientes con hiperplasia benigna de próstata (HBP), se asocia con una disminución del riesgo de presentar tumores de próstata bien diferenciados.

Antonio Alcaraz, jefe del Servicio de Urología del

Hospital Clínico de Barcelona y miembro del comité científico del congreso, ha explicado a DIARIO MÉDICO que estudios previos con finasteride, otro fármaco para la HBP, ya habían demostrado un efecto similar, pero asociado con un aumento del número de casos de tumores no diferenciados, lo que obligó a detener la investigación en esta línea.

Entre los participantes del estudio *Reduce* no se ha observado esta situación, ya que el riesgo de tumores de

próstata no diferenciados no presentó cambios significativos, lo que sugiere que este fármaco podría ser de utilidad como estrategia de prevención del cáncer de próstata en pacientes de alto riesgo, con un índice de PSA superior a 2,5 y con una biopsia previa negativa.

Este fármaco también se ha asociado con una reducción del riesgo de retención urinaria aguda, de las infecciones del tracto urinario y de la necesidad de cirugía relacionada con la HPB.



## Agenda

### 16-20 de abril

■ 25º Congreso de la Asociación Europea de Urología. Continúa en Barcelona la reunión, a la que asisten 12.000 especialistas.

### 21-24 abril

■ 37ª Jornadas Nacionales de Sociodrogalcohol. En el Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo (Asturias).

### 22 de abril

■ Encuentro Flemibion 2010. En el Hotel Vincci Soho de Madrid, (calle Prado nº 18).